



Przy zdjęciach ukośnych istotny jest kierunek obserwacji,
widoczne są tylko fragmenty kolein po urządzeniach rolniczych



Chwasty wschodzące na polu po zabiegu agrotechnicznym



Zwięzłość materiału powoduje zwiększenie zbrylenia przy tym samym zabiegu, istotny jest również wpływ wilgotności (bardziej zwięzłe to bardziej wilgotne)



Odwrócenie gleby podczas zabiegu, gleba odwrócona jest wilgotniejsza od wyschniętej na powierzchni



Nieużytek wieloletni, widoczne małe drzewa



Nieużytek jednoroczny (maksymalnie dwa lata), widoczne
bardzo małe drzewka i krzewy




Prace ziemne prowadzone często na polach przy inwestycjach drogowych



Toposekwencyjne zróżnicowanie gleb, ciemne
próchniczne gleby hydrogeniczne położone
wzdłuż naturalnego cieku



Zabieg wykonywany od takiego samego
ustawienia maszyny rolniczej



Drzewa przy słupach linii energetycznej



Woda stojąca w między rzędani



Pole o zróżnicowanej topografii,
pofalowane, widoczne zerodowane
gleby na wyniesieniach



Widoczne ślady po zwierzętach







Pole na glebach piaszczystych , w
obniżeniach gleby hydrogeniczne –
czarne ziemie



Bale słomy oczekujące na zwiezenie



Ta sama powierzchnia widziana z różnych
kierunków



Niekonwencjonalny sposób wykonywania
zabiegów agrotechnicznych



























Zaniedbane gospodarstwo (albo „dziupla”)





Niezebrane bale słomy po poprzednim
koszeniu















